

Tabel 2. Meta-analyse en GRADE psychotherapie versus controlegroepen

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Opmerkingen
	Risico met placebo	Risico met Meaning-centered				
Angst	-	SMD 0.65 lager (1.05 lager tot 0.26 lager)	-	676 (11 studies)	⊕⊕⊕⊕ LAAG ^{a,b}	Psychotherapie lijkt angst te verminderen bij patiënten in de palliatieve fase.
QoL	-	SMD 0.17 hoger (0.16 lager tot 0.51 hoger)	-	148 (3 studies)	⊕⊕⊕⊕ ZEER LAAG ^{a,b,c}	Het bewijs is zeer onzeker over het effect van psychotherapie op kwaliteit van leven in de palliatieve fase.

a. Risico op bias

b. Heterogeniteit

c. Onnauwkeurigheid

CI: confidence interval

Risico met controle: Aantal controlepatiënten met een event, als deel van het totaal aantal patiënten. Weergegeven per 1.000.

SMD: standardized mean difference

Risico met controle: achtergrondrisico (Kans (of risico) op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep)