

**Tabel 3 Bijwerkingen van snelwerkende fentanylpreparaten (ROO's)**

	N	Sufheid	Duizeligheid	Misselijkheid	Braken	Obstipatie
Fentanyl neusspray (Kress, 2009)	120	Niet vermeld	7,5%	13,3%	6,7%	10%
Fentanyl neusspray (Mercadante 2009)	122	1,6%	3,3%	8,2%	4,9%	4,1%
Fentanyl pectine neusspray (Portenoy, 2010-1)	113	3,5%	8,0%	8,8%	10,6%	Niet vermeld
Fentanyl pectine neusspray (Portenoy, 2010-2)	356	3,5%	5,2%	2,5%	3,7%	3,5%
Fentanyl pectine neusspray (Fallon, 2011)	80	1,3%	0%	1,3%	3,8%	1,3%
Fentanyl pectine neusspray (Taylor, 2013)	171	Niet vermeld	3,5%	9,4%	9,4%	8,8%
Fentanyl sublinguale tablet (Rauck, 2009)	131	4,6%	Niet vermeld	12,2%	5,3%	Niet vermeld
Fentanyl sublinguale tablet (Nalamachu, 2011)	139	5,8%	2,9%	8,6%	2,2%	5,8%
Fentanyl sublinguale tablet (Novotna, 2014)	93	2,2%	Niet vermeld	4,4%	5,5%	Niet vermeld
Fentanyl buccale film (Rauck, 2010)	151	6,0%	4,6%	9,3%	9,3%	Niet vermeld
Fentanyl buccale tablet (Portenoy, 2006)	123	10%	22%	22%	11%	8%
Fentanyl buccale tablet (Slatkin, 2007)	125	Niet vermeld	11%	13%	6%	6%
Fentanyl buccale tablet (Weinstein, 2009)	232	10%	Niet vermeld	6%	Niet vermeld	8%
Fentanyl buccale tablet (Kosugi, 2013)	103	27,2%	Niet vermeld	10,7%	13,6%	Niet vermeld
Fentanyl buccale stick (Farrar, 1998)	130	8%	17%	14%	3%	5%
Fentanyl buccale stick (Mercadante 2009)	118	2,5%	1,7%	7,6%	3,4%	3,4%
Fentanyl buccale stick (Payne, 2001)	155	9%	8%	8%	5%	8%
Mediane frequentie (range)		5,3% (1,3-27,2)	4,6% (0-17)	8,2% (1,3-22)	5,4% (2,2-13,6)	6,3% (1,3-10)