


PaTz en het PaTz register verminderen SEH bezoeken en ziekenhuis opnames in de laatste maand voor overlijden

In de SentiMELC studie (Monitoring End of Life Care aan de hand van een Sentinel netwerk van huisartsen) worden gegevens over zorg aan het levenseinde verzameld. Deze worden geregistreerd door huisartsen die aangesloten zijn bij de zogenoemde 'huisartsenpeilstations'. In de periode 2016 t/m 2019 zijn 1848 overlijdens gerapporteerd door 15 verschillende peilstations.



Van de 1848 overledenen, waren er 1102 verwacht overleden; daarvan hadden er 299 een huisarts die deelnam aan een PaTz groep en 803 hadden een huisarts die niet deelnam aan PaTz. Deze 2 groepen verschilden niet qua leeftijdsverdeling of diagnosegroepen; in de groep overledenen met huisarts in PaTz groep zaten iets meer vrouwen (51.2% vs 43.3%). 210 overledenen stonden ook opgenomen in het PaTz register; 144 van hen waren ook besproken in de PaTz groep.

Wij hebben gekeken wat de invloed is van

- 1) **wel/ geen PaTz deelname van de huisarts**
- 2) **wel/ niet in het PaTz register staan**
- 3) **wel/ niet besproken in de PaTz groep**


op de zorg in de laatste maand voor overlijden.

1) Wel of geen deelname aan PaTz

PaTz deelname resulteert in significant (*) minder SEH bezoek en ziekenhuisopnames.

Patiënten van huisartsen die *niet* deelnemen aan PaTz hebben 1,5 keer zoveel kans op een SEH-bezoek en 1,4 keer zoveel kans op een opname de maand voor overlijden.

Ook overlijden mensen wiens huisarts deelneemt aan een PaTz groep minder vaak in het ziekenhuis; dit verschil is niet significant.




2) Wel of geen opname in het PaTz register

Opname in het PaTz register resulteert in significant (*) minder ziekenhuisopnames en minder overlijden in het ziekenhuis.

Patiënten die *niet* zijn opgenomen in het register hebben 3,4 keer zoveel kans om opgenomen te worden in de laatste maand en 4 keer zoveel kans om te overlijden in het ziekenhuis.

Ook SEH bezoek komt minder vaak voor bij patiënten die opgenomen zijn in het PaTz register t.o.v. patiënten die niet opgenomen zijn in het PaTz; dit verschil is niet significant.



3) Wel of niet besproken in de PaTz groep

Van de 210 overledenen die in het PaTz register opgenomen waren, werden er 144 ook besproken in de PaTz groep; 66 werden niet besproken. Besproken patiënten belanden significant minder vaak op de SEH: 11,1% (=16) vs. 28,8% (n=19) van de niet-besproken patiënten.

Ziekenhuisopnames komen ook minder voor bij besproken overledenen (21,5% vs 33,3%). Dit verschil is niet significant.

Conclusie: PaTz werkt!

Uitgaande van de wetenschap dat de meeste mensen thuis willen overlijden en onnodige SEH en ziekenhuisopnames willen vermijden, kunnen we concluderen dat PaTz werkt. Wel of geen PaTz deelname maakt al verschil; opname in het PaTz register en besproken worden in de PaTz groep versterken deze verschillen.