

Tabel 2 - Analgetica bij levercirrose(Weersink 2018, zie ook <http://geneesmiddelenbijlevercirrose.nl/>)

		Child-Pugh A	Child-Pugh B	Child-Pugh C
Paracetamol	Veiligheid	veilig		
	Dosering	aanpassing van de dosering is niet nodig		
NSAID's	Veiligheid	onveilig		
	Dosering	geen doseeradvies (onveilig)		
Fentanyl	Veiligheid	veilig	veilig	geen nadelige effecten bekend
	Dosering	start met een halve begindosering en verhoog voorzichtig	start met een halve begindosering en verhoog voorzichtig	start met een halve begindosering en verhoog voorzichtig
Buprenorfine¹	Veiligheid	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend
	Dosering	aanpassing van de dosering is niet nodig	start met een halve begindosering en verhoog voorzichtig	start met een halve begindosering en verhoog voorzichtig
Morfine	Veiligheid	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend
	Dosering (PO)	start met halve begindosering en verhoog voorzichtig	start met halve begindosering en verhoog voorzichtig	start met een kwart begindosering en verhoog voorzichtig
	Dosering (IV)	geen dosisaanpassing	verdubbel het doseerinterval	verdubbel het doseerinterval
Oxycodon	Veiligheid	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend
	Dosering	start met een halve begindosering en verhoog voorzichtig	start met een halve begindosering en verhoog voorzichtig	start met een halve begindosering en verdubbel het doseerinterval
Hydromorfon	Veiligheid	onbekend	onbekend	onbekend
	Dosering (PO)	start met een kwart begindosering en verhoog voorzichtig	start met een kwart begindosering en verhoog voorzichtig	start met maximaal een kwart begindosering en verhoog voorzichtig

	Dosering (IV)	geen doseeradvies mogelijk	geen doseeradvies mogelijk	geen doseeradvies mogelijk
Tapentadol	Veiligheid	onbekend	onbekend	onveilig
	Dosering	aanpassing van de dosering is niet nodig	start met 50 mg maximaal elke 8 uur of 50 mg 1 keer daags en verhoog voorzichtig	geen doseeradvies (onveilig)
Methadon	Veiligheid	nadelige effecten bekend	nadelige effecten bekend	nadelige effecten bekend
	Dosering	aanpassing van de dosering is niet nodig	aanpassing van de dosering is niet nodig	aanpassing van de dosering is niet nodig
Codeïne¹	Veiligheid	nadelige effecten bekend	onveilig	
	Dosering	aanpassing van de dosering is niet nodig	Geen doseeradvies (onveilig, want onwerkzaam)	
Tramadol¹	Veiligheid	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend	geen nadelige effecten bekend
	Dosering	start met 50 mg elke 12 uur, verhoog op geleide van effect en bijwerkingen	start met 25 mg, verhoog tot maximaal 100 mg elke 12 uur	

(1) Het gebruik van deze middelen bij de behandeling van pijn wordt in deze richtlijn niet geadviseerd.