



Dignity therapy (Li 2019)

Forestplot: Dignity therapy (angst)



Forestplot: Dignity therapy (kwaliteit van leven)



Tabel 4. Meta-analyse en GRADE Dignity therapy versus standaardzorg

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Opmerkingen
	Risico met placebo	Risico met Dignity therapy				
Angst	-	SMD 1.07 lager (1.57 lager tot 0.58 lager)	-	868 (9 studies)	⊕⊕⊕⊕ LAAG ^{a,b}	Het bewijs suggereert dat <i>dignity therapy</i> resulteert in een grote vermindering van angst bij patiënten in de palliatieve fase.
Kwaliteit van leven	-	SMD 0.05 lager (0.29 lager tot 0.2 hoger)	-	255 (2 studies)	⊕⊕⊕⊕ REDELIJK ^{a,c}	<i>Dignity therapy</i> resulteert waarschijnlijk niet in een verbetering van kwaliteit van leven.

a. Risico op vertekening

b. Heterogeniteit in de resultaten

c. Onnauwkeurig (breed betrouwbaarheidsinterval)

CI: confidence interval

Risico met controle: Aantal controlepatiënten met een event, als deel van het totaal aantal patiënten. Weergegeven per 1.000.

SMD: standardized mean difference

Risico met controle: achtergrondrisico (Kans (of risico) op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep)