

Richtlijn Hoesten in de palliatieve fase

Tabel 2. Opsomming van medicatie dat nu op voorschrift wordt uitgegeven bij chronische hoest in palliatieve fase, al dan niet evidence-based

Disclaimer: Deze tabel kijkt af van de aanbevelingen in de module Hoestdempende middelen in de richtlijn Chronische hoest bij volwassenen. Dit heeft te maken met de patiëntengroep voor wie de adviezen in deze module staan. In de palliatieve fase is er mogelijk meer off-label gebruik van medicatie.

Middel	Dosis	Effect	Opmerking	Referentie
Aan te bevelen				
Gabapentine	Dosis titratie tot maximaal 600 mg 3xdaags	Aan te raden	Proeftherapie van 2 tot 4 weken; pregabaline de voorkeur t.o.v. gabapentine vanwege minder titreren en 2xdaagse toediening	Ryan 2012
Pregabaline	Dosis titratie tot maximaal 150 mg 2xdaags	Aan te raden	Proeftherapie van 2 tot 4 weken; pregabaline de voorkeur t.o.v. gabapentine vanwege minder titreren en 2xdaagse toediening	Vertigan, 2016; Adeli, 2023
Gefapixant	45 mg 2xdaags	Veelbelovend, enkel op indicatie	Proeftherapie 4 weken; niet vergoede medicatie (3,77 euro/dag); gunstiger bijwerkingenprofiel dan bovengenoemde medicatie	MacGarvey 2022; McGarvey, 2023; Smith, 2020
Morfine	10 mg retard 2xdaags gedurende 2 weken	Interindividueel, anekdotisch	Na 2 tot maximaal 4 weken gebruik, geen respons dan staken	Morice 2007
1 ^{ste} generatie antihistaminica (doxylamine, hydroxyzine, prometazine)		Interindividueel, anekdotisch	Na 2 tot maximaal 4 weken gebruik, geen respons dan staken	Dicpinigaitis 2014; Morice 2017
Beperkt tot geen effect				
Codeïne	10-20 mg 6xdaags	Geen	Afgeraden wegens ontbrekend wetenschappelijk bewijs, onvoorspelbaar gedrag bij polymorfisme en geneesmiddeleninteracties bij metabolisme via P450 cytochroom 2D6	Gasche 2004; Matthys 1983
Paroxetine	20 mg 1xdaags	Geen tot beperkt	Na 2 tot maximaal 4 weken gebruik, geen respons dan staken	Thakerar 2020; Yancy 2013; Zylicz 2004
Lidocaïne	2% keelspray, verneveling of 4 mL 4xdaags	Geen tot beperkt	Af te raden wegens kans op aspiratie door verdoving van de keel.	Abdulqawi 2021; Dicpinigaitis 2014; Homsy 2001; Yancy 2013
Bupivacaïne	0.25% keelspray of 5 mL 6xdaags	Geen tot beperkt	Af te raden wegens kans op aspiratie door verdoving van de keel.	Homsy 2001; Yancy 2013