

Stappenplan

Vastgesteld op: 23-07-2008

Methode: consensus based

Regiehouder: IKNL

Gegenereerd op: 24-06-2024

Bron: <https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/archief/koorts/stappenplan>

Inhoudsopgave

STAPPENPLAN	3
Diagnostiek	3
Beleid	3
Bewijsvoering	3

Stappenplan

Vastgesteld: 23-07-2008 Regiehouder: IKNL

Diagnostiek

1. Anamnese en lichamelijk onderzoek
2. Op indicatie aanvullend onderzoek

- laboratorium: CRP, leucocyten + differentiatie, urinesediment
- microbiologisch onderzoek
- X-thorax of ander beeldvormend onderzoek

Beleid

1. Behandeling van de oorzaak

- behandeling van de onderliggende ziekte
- aanpassing van de medicatie
- staken van toediening van bloed of bloedproducten
- behandeling van infectie, trombose/longembolie of graft versus hostreactie

2. Niet-medicamenteus

- maatregelen ter verwarming (bij oplopende temperatuur) of juist verkoeling (bij hoge temperatuur)
- zorg voor voldoende inname van vocht

3. Medicamenteus

- paracetamol 2-4 dd 1000 mg p.o. of rectaal
- NSAID:
 - diclofenac 2-3 dd 25 mg p.o. of rectaal
 - naproxen 2-3 dd 250 mg p.o. of rectaal
 - ibuprofen 2-3 dd 200-400 mg p.o., zo nodig met maagbescherming
- dexamethason 1 dd 4-8 mg p.o./s.c.



Bewijsvoering



Tabel Niveaus van bewijsvoering richtlijn Koorts 2008

Behandeling	Niveau van bewijsvoering	Referentie(s)
Niet-medicamenteuze maatregelen	4	Plaisance 2007, Styrt 1990
Paracetamol ^A	3	Oborilova 2002
NSAID's ^A	2	Chang 1985 en 1988, Economos 1995, Oborilova 2002, Tsavaris 1990
Dexamethason ^A	4	Chang 1988

^A Bij paraneoplastische koorts

Niveau 1 = gebaseerd op systematische review of ten minste twee gerandomiseerde onderzoeken van goede

kwaliteit.

Niveau 2 = gebaseerd op ten minste twee vergelijkende klinische onderzoeken van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of andere vergelijkende onderzoeken.

Niveau 3 = gebaseerd op één vergelijkend onderzoek of op niet-vergelijkend onderzoek.

Niveau 4 = gebaseerd op mening van deskundigen.