

ACUTE ZORG BIJ VENEUZE OF ARTERIELE BLOEDING ('BLOW-OUT') BIJ MALIGNIE HOOFD- HALSTUMOREN

Een blow out is feitelijk een fatale bloeding. Oorzaak ervan is veelal een tumor in de long of in het KNO gebied. Risico van de plaats van de tumor is doorgroei in een groot bloedvat, soms arterie, waardoor een explosieve bloeding kan ontstaan. Deze bloeding is altijd fataal, het gaat dus om een grote bloeding.

Na behandeling of door ingroei van een maligne halstumor kan een zogenaamde 'blow-out' optreden. Van tevoren is het besluit genomen dat er geen curatief gerichte behandeling meer geboden wordt [de patient mag overlijden]. Patient wordt zo mogelijk op een eenpersoonskamer verpleegd. Op de kamer zijn donkere (hand)doeken en handschoenen aanwezig.

In de slaapkamer van de bewoner staat een bekkentje met daarin twee ampullen **Midazolam** 50Mgr/10cc en een 10cc spuit met opzuignaald en een i.m. naald klaar.

In *principe* is de patient van het risico op 'blow-out' op de hoogte. Belangrijk is dat de naaste familieleden **altijd** van dit gevaar op de hoogte zijn. Het ontstaan van de bloeding is vrijwel altijd een zeer ingrijpende ervaring voor aanwezige familieleden.

**Er ontstaat een Blow-Out. (arterieel of veneus)
Er dreigt verstikking**

- Verzorgende blijft bij patiënt en dekt de bloedende plaats af (donkere handdoeken)
- Alarmeert 2^e verzorgende via noodbel, 2^e verzorgende belt de verantwoordelijk dienst of arts.
- 1^{ste} verzorgende trekt midazolam op

Dien 25 mgr Midazolam
intramusculair toe
(Werkt na c. 5-10 min)

Tweede verzorgende neemt de opvang en begeleiding van de familie van de patient op zich

Nazorg aan familie, nazorg aan aanwezige hulpverleners [door arts en verpleegkundige(n)]