

Radboud indicators for Palliative Care needs-Parkinson's Disease RADPAC-PD

Introductie

Recent werd in Nederland een instrument ontwikkeld om de palliatieve zorgbehoeften in beeld te brengen van mensen met de ziekte van Parkinson. Dit instrument, de RADPAC-PD (Radboud indicators for Palliative Care needs-Parkinson's Disease), is voor alle betrokken professionals in de eerste en tweede lijn ontwikkeld en markeert twee belangrijke momenten om palliatieve zorg vorm te geven voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het eerste markeringsmoment is het uiterste moment waarop proactieve zorgplanning gestart dient te worden. Het tweede markeringsmoment is het moment waarop de palliatieve fase aanvangt.

| RADPAC-PD | Is bij de patiënt sprake van | | |
|--|------------------------------------|-----|----------|
| | Ja | Nee | Onbekend |
| Deel 1: Indicatoren voor het starten met Advance care planning* | | | |
| Een verzoek om gesprekken over levenseinde(zorg) of ACP? | | | |
| Het verliezen van hoop en/of angst voor de toekomst? | | | |
| Frequent vallen? | | | |
| Slikproblemen of een eerste aspiratiepneumonie? | | | |
| Cognitieve problemen en/of neuropsychiatrische problematiek? | | | |
| Een (eerste) ongeplande ziekenhuisopname? | | | |
| Deel 2: Indicatoren voor het markeren van de palliatieve fase | | | |
| Het kiezen voor doelen die gericht zijn op het maximaliseren van comfort? | | | |
| Een verschuiving in de zorg door bijvoorbeeld herhaaldelijke ziekenhuisopnames, verpleeghuisopname en/of toename in ondersteuning bij ADL? | | | |
| Het instellen van parkinsonmedicatie leidt niet meer tot het gewenste effect | | | |
| Meerdere specifieke parkinsonsymptomen of complicaties, zoals bijvoorbeeld significant gewichtsverlies, recidiverende infecties, progressieve slikproblemen, neuropsychiatrische problematiek en/of frequent vallen? | | | |

**De RADPAC-PD maakt nog gebruik van de term 'ACP' (advance care planning) terwijl tegenwoordig de term 'proactieve zorgplanning' meer gangbaar is.*

***Indien er sprake is van 1 of meer aanwezige indicatoren kan dit een indicatie zijn voor het starten met Advance care planning, dan wel het markeren van de palliatieve fase bij Parkinson*

Bronvermelding: Lennaerts-Kats H, van der Steen JT, Vijftigschild Z, Steppe M, Meinders MJ, Munneke M, Bloem BR, Vissers KCP, Groot MM. RADPAC-PD: A tool to support healthcare professionals in timely identifying palliative care needs of people with Parkinson's disease. PLoS One. 2020 Apr 21;15(4):e0230611. doi: 10.1371/journal.pone.0230611.

De RADPAC-PD is ontwikkeld door het ParkinsonSupport project dat uit de volgende samenwerkende partijen bestaat: Parkinson Vereniging, ParkinsonNet, Radboudumc. Het project is gefinancierd door ZonMW programma Palliatie en ParkinsonNL. Voor het gebruik van de RADPAC-PD wordt verwezen naar [Inhoud palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson - Richtlijn - Richtlijndatabase](#)

Contactpersoon: dr. Herma Lennaerts – Kats, herma.lennaerts@radboudumc.nl