



## Effect van dignity therapy op depressie



## Effect van dignity therapy op kwaliteit van leven



Tabel 4. Meta-analyse en GRADE dignity therapy versus controlegroepen

Uitkomsten	Absolute effecten* (95% CI)		Relatief effect (95% CI)	Aantal deelnemers (studies)	Certainty of the evidence (GRADE)	Opmerkingen
	Risico met controle	Risico met Dignity therapy				
Depressie score		SMD 1.31 lager (1.92 lager tot 0.70 lager)		904 (10 studies)	⊕⊕⊕⊕ LAAG <sup>a,b</sup>	Dignity therapy lijkt te resulteren in een grote vermindering van depressie bij patiënten in de palliatieve fase.
Kwaliteit van leven		SMD 0.05 lager (0.29 lager tot 0.20 hoger)		255 (2)	⊕⊕⊕⊕ REDELIJK <sup>a</sup>	Dignity therapy resulteert waarschijnlijk niet in een verbetering van kwaliteit van leven bij patiënten in de palliatieve fase.

GRADE (door Li2020)

a. Risico op vertekening

b. heterogeniteit

CI: confidence interval

Risico met controle: Aantal controlepatiënten met een event, als deel van het totaal aantal patiënten.

Weergegeven per 1.000.

SMD: standardized mean difference

Risico met controle: achtergrondrisico (Kans (of risico) op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep)