

Module Preventie van hypercalciëmie

Tabel 6. Overzicht van effect op hypercalciëmie van denosumab en bisfosfonaten bij patiënten met multipel myeloom

| Studie | Effect op hypercalciëmie¹ |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Belch 1991 | Etidroninezuur: 25.0% ¹ ; placebo: 18.9% |
| Berenson 1996, Berenson 1998 | Pamidroninezuur: 9.1%; placebo: 8.9% |
| Diel 2015 | Denosumab: 1.1%; zoledroninezuur: 6.5% |
| Garcia-Sanz 2015 | Zoledroninezuur: 0%; geen zoledroninezuur: 4.1% |
| Gimsing 2010 | Pamidroninezuur 90 mg: 0.4%; pamidroninezuur 30 mg: 2.0% |
| Lahtinen 1992 | Clodroninezuur: 4.8%; placebo: 7.1% |
| Menssen 2002 | Ibandroninezuur: 8.1%; placebo: 13.1% |
| Musto 2003 | Pamidroninezuur: 2.5%; geen pamidroninezuur: 7.3% |
| Terpos 2000 | Pamidroninezuur: 0%; geen pamidroninezuur: 10% |
| Terpos 2003 | Pamidroninezuur: 0%; ibandroninezuur: 0% |

¹ Proportie patiënten met hypercalciëmie