

Instrumenten voor signaleren en markeren in de palliatieve fase

Onderstaande lijst is een weergave van instrumenten die in de praktijk veel gebruikt worden. Meer weten over een instrument? Scan de QR code!



REPOS

De Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) bestaat uit 12 items en wordt gebruikt voor het monitoren van pijn bij ouderen met een communicatiebeperking en volwassenen met een verstandelijke beperking.



PACSLAC

De Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC-D) bestaat uit 24 items en wordt gebruikt voor het monitoren van pijn bij patiënten met gevorderde dementie of een verstandelijke beperking.



PAIC 15

De Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC-15) helpt bij het herkennen van vijftien signalen van pijn bij patiënten met beperkte cognitieve vaardigheden, verdeeld over drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden.



DS-DAT

De DS-DAT is een meetschaal voor het meten van het welbevinden van patiënten.



Qualidem

De Qualidem is bedoeld om de kwaliteit van leven te meten van cliënten met lichte tot ernstige cognitieve beperkingen in de ouderenzorg.



Eenzaamheidsschaal

Bij individuele patiënten biedt deze vragenlijst een indicatie in hoeverre de patiënt zich eenzaam voelt.



PPS

De Palliative Performance Scale (PPS) bestaat uit 5 items en wordt gebruikt voor het monitoren van de functionele status van patiënten in de palliatieve fase.



USD

Het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) bestaat uit 12 items en wordt gebruikt om symptomen op de fysieke en psychische dimensie bij patiënten in de palliatieve fase te signaleren en monitoren. Het USD wordt ingevuld door de patiënt.



Lastmeter

De Lastmeter bestaat uit 50 items en wordt gebruikt om de ervaren ziektelast op alle vier de dimensies (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) van patiënten met kanker te signaleren.

Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase levert een bijdrage aan het op tijd herkennen van patiënten in de stervensfase en het verlenen van goede zorg bij aanvang, tijdens en na de stervensfase zoals beschreven in het [Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland](#).



PDF van het Zorgpad Stervensfase die in het **ziekenhuis** kan worden gebruikt.



PDF van het Zorgpad Stervensfase die in de **thuiszorg** kan worden gebruikt.



PDF van het Zorgpad Stervensfase die in het **verpleeghuis** en het **hospice** kan worden gebruikt.

Kijk voor meer meetinstrumenten op <https://palliaweb.nl/meetinstrumenten>