




Zorgpad Dehydratie en vochttoediening




Indicatie behandelen oorzaak



Indicatie starten vochttoediening (1)





[Terug naar beslisboom overzicht](#)

Onderbouwing

Aanbevelingen

Dehydratie in de palliatieve fase (exclusief de stervensfase)

Indien passend in het licht van de wens van de patiënt, de setting (thuis, hospice, verpleeghuis, ziekenhuis of elders), de algehele toestand en de levensverwachting:

- Overweeg om na te gaan wat de oorzaak is van de dehydratie en deze te behandelen (bijv. behandeling van braken, diarree of hypercalciëmie).

De beslisboom is gebaseerd op de richtlijn Dehydratie en vochttoediening.

De richtlijn is te vinden op [Palliaweb](#)

Onderbouwing



Aanbevelingen

Dehydratie in de palliatieve fase (exclusief de stervensfase)

Indien passend in het licht van de wens van de patiënt, de setting (thuis, hospice, verpleeghuis, ziekenhuis of elders), de algehele toestand en de levensverwachting:

- Overweeg toediening van vocht met als doel om de klachten van de patiënt, de kwaliteit van leven en/of de overleving te verbeteren. Weeg hierbij de voor- en nadelen van rehydratie af samen met de patiënt en naasten.

De beslisboom is gebaseerd op de richtlijn Dehydratie en vochttoediening.

De richtlijn is te vinden op [Palliaweb](#)

Versie 1.0.0 goedgekeurd door PZNL op 8-10-2024. [Gebruiksvoorwaarden](#)

Sluiten

Onderbouwing



Aanbevelingen

Indien besloten is tot toediening van vocht:

- Laat de patiënt extra drinken, als dat mogelijk is en er op die wijze voldoende vocht kan worden binnengekregen om het vochttekort aan te vullen.
- Als dat niet mogelijk is:
 - Overweeg intraveneuze toediening van vocht als:
 - de patiënt reeds (om andere redenen) een intraveneuze toegang (infuus, PICC-lijn, volledig implanteerbaar toedieningssysteem of subclaviakatheter) heeft;
 - de patiënt een centrale lijn (volledig implanteerbaar toedieningssysteem of subclaviakatheter) heeft;
 - er grote hoeveelheden vocht (meer dan 1-2 l/24 uur) toegediend worden;
 - er geen ervaring en expertise is met subcutane toediening
 - Overweeg in overige gevallen subcutane toediening van vocht (hypodermoclyse).
NB Parenterale (subcutane en intraveneuze) vochttoediening in de thuissituatie valt buiten de expertise van de huisarts. De huisarts kan deze module raadplegen als daar behoefte aan is.
- Geef bij parenterale toediening bij voorkeur 0,9% NaCl. In veel gevallen kan worden volstaan met 1 liter per 24 uur.
- Overweeg enterale toediening van vocht alleen als de patiënt reeds een voedingssonde heeft.

De beslisboom is gebaseerd op de richtlijn Dehydratie en vochttoediening.
De richtlijn is te vinden op [Palliaweb](#)

Versie 1.0.0 goedgekeurd door PZNL op 8-10-2024. [Gebruiksvoorwaarden](#)

Sluiten