

Richtlijn Hoesten in de palliatieve fase

Tabel 1. Mogelijke oorzaken van hoesten in de palliatieve fase

Disclaimer: Deze tabel geeft een overzicht van veelvoorkomende oorzaken van hoesten in de palliatieve fase op basis van expert opinion en beschikbare literatuur. Omdat er geen systematische literatuurstudie is uitgevoerd, is de tabel mogelijk niet volledig (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2010; Bonneau, 2009; Dudgeon, 2002; Wee, 2008)

Differentiaaldiagnose bij volwassenen met hoest in palliatieve fase	
Oorzaken	Diagnosen
Niet-maligne	Neuromusculair (bij dysfagie) <ul style="list-style-type: none"> • Multiple sclerose • ALS • Erfelijke ataxie (o.a. CANVAS) • Vergevoerde dementie • CVA • Parkinson of parkinsonisme Overig <ul style="list-style-type: none"> • Interstitiële longziekten (ILD) • COPD (verwijs naar COPD-richtlijn) • Overige longziekten • Opportunistische infecties • Eindstadium hartfalen • Eindstadium nierfalen
Maligne Direct veroorzaakt door kanker	Primair/secundaire longtumoren Lymfangitis carcinomatosa Luchtwegobstructie Pleura effusie/ pleuritis carcinomatosa Vena cava superior syndroom Hersenmetastasen/hersentumor
Maligne Indirect veroorzaakt door kanker	Longembolie, tumor microembolie Longaspiratie Paraneoplastisch syndroom Radiatiepneumonitis Pneumonitis of hartschade t.g.v. systemische therapie Dysfagie door (behandeling van) hoofdhalstumoren
Overig	Chronische rhinitis Astma, (eosinofiele) bronchitis Gastro-oesofageaal reflux (GORZ) Postnasale drip Infecties bovenste en onderste luchtwegen Bronchiëctasieën Slaapapnoe syndroom Aspiratie <ul style="list-style-type: none"> • Vreemd voorwerp • Gastro-oesofageale reflux • Oesofagotracheale fistel Medicatie o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • ACE-remmers • Benzodiazepines • Methotrexaat • NSAIDs Roken